

വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽനിന്ന് മത്സ്യക്കൃഷിയെ രക്ഷിക്കാം.

കനത്ത മഴയും വെള്ളപ്പൊക്കവും ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ കർഷകർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

വികാസ് പി. എ.,
ഷിനോജ് സൂപ്രഹ്ബണ്യൻ

മത്സ്യക്കൃഷിയിൽനിന്നു തനിതികൾ പ്രചാരം നേടുകയും പ്രവാസികളുടെ ഒട്ടേറെ സഹകരണം മേഖലയിൽ താൽപര്യം കാണിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കനത്ത മഴയും വെള്ളപ്പൊക്കവും ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നത്. പുഴയോരങ്ങളിലും താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള മത്സ്യക്കൃഷിയെയും പുഴകളിലെയും കായലുകളിലെയും കൂടുതൽ മത്സ്യക്കൃഷിയെയും പ്രളയക്കെടുതികൾ സാരമായി ബാധിക്കുന്നു. അലങ്കാര മത്സ്യക്കൃഷിക്കും ഇതു തടസ്സമാകുന്നു. വെള്ളപ്പൊക്കം കൂടുതലായും ഉണ്ടാകുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ ഒക്ടോബർ വരെയാണ്. അതിനാൽ മത്സ്യക്കൃഷി



കൂടുതൽ മത്സ്യക്കൃഷി പ്രളയശേഷം

ഷിയുടെ കാലക്രമത്തിലുൾപ്പെടെ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്.

സ്വാഭാവിക കുളങ്ങളിൽ

ക്രിസ്മസ് വിപണി ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് മിക്ക കർഷകരും കടല, രോഹു, മൂഗാൻ, വാള, തിലാപ്പിയ തുടങ്ങിയ

ശുദ്ധജല മത്സ്യങ്ങളെ കുളങ്ങളിൽ വളർത്തുന്നത്. പ്രളയഭീഷണിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വിളവെടുപ്പ് കഴിവതും ജൂലൈ മാസത്തിനകം നടത്തുന്നതാണ് നല്ലത്. കുളങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു മീറ്റർ ഉയരത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ മുൻ വർഷങ്ങളിൽ വെള്ളം



മത്സ്യക്കുളത്തിനരികെ ബൈജു

കയറിയ അളവ് നീർ മുക്കിയിട്ട് വരത്തക്ക രീതിയിലോ ഹൈ ഡെൻസിറ്റി പോളി എതിലിൻ(HDPE - 2മി. മീ. X 40 മി. മീ.) വലയം ഉപയോഗിച്ചു വേലി കെട്ടുക. കുളങ്ങളിൽ കുളത്തിൽ എച്ച്ഡിപിഇ(HDPE- 1.5മി. മീ. X 80 മി. മീ.) വലയം ഉപയോഗിച്ചു മുക്കുക. കുളങ്ങളിലേക്ക് മറ്റിടങ്ങളിൽനിന്നു വെള്ളം ഒഴുക് വരാതിരിക്കാൻ നടപ്പി യെടുക്കുക. കുളങ്ങളുടെ ബണ്ടുകളു ടെ ഉയരം പരമാവധി ഉയർത്തുക. ഇത്രയും മുൻകരുതലുകൾ എടുത്താൽ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ മീൻ നഷ്ടപ്പെടു ന്നത് ഒരു പരിധിവരെ തടയാം.

കൃത്രിമക്കുളങ്ങളിൽ

പ്രളയ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കാങ്കുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് നന്നല്ല. ഒഴി ച്ചുകൂടാത്തവയായ സാഹചര്യത്തിൽ കാങ്കുകൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തറ ഉയർ ന്നായിരിക്കണം. ജലനിരപ്പുയരുന്ന സ മയത്തു വൈദ്യുതിതടസ്സമുണ്ടാകും എന്നതിനാൽ ജനറേറ്റർ തീർച്ചയായും ഒരുക്കണം. കഴിയുമെങ്കിൽ ജലമെ ല മാസത്തിനുള്ളിൽത്തന്നെ വിളവെടുക്കുക.

അലങ്കാരമത്സ്യക്കുഴി

പ്രളയസാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ സൗകാരിക കുളങ്ങളിൽ വിദേശ ഇ നം മത്സ്യങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന അലങ്കാര മത്സ്യക്കുഴി പാടില്ല. അലിഗറ്റർ ശരം, അരാക്കൻ, അരോണ, മുഷി, കോയി കാർഷി, ഗോൾഡ് ഫിഷ്, റെഡ് ബെ ള്ലിഡ് പാക്കു, സക്കർ ക്യാറ്റ് ഫിഷ്, ഗി ഫ്റ്റ് (ജെനറ്റിക്കൽ ഇംപ്രൂവ്ഡ് ഫാം ഡിസ്കോപ്പിയം) തുടങ്ങിയവ വിദേശമത്സ്യ ങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ എത്തി നാടൻമത്സ്യങ്ങളുടെ നിലനില്പിനു ഭീഷണിയോകുമെന്നതും ഈ ആവാ സവ്യവസ്ഥയിൽ മാറ്റം വരുത്താനിട യുണ്ട് എന്നതുമാണ് കാരണം. പ്രളയ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉയര

സുരക്ഷയ്ക്ക് ഇരുന്നൂമ്പല വേലി

സ്മിന്ദിമാലി വെള്ളപ്പൊക്കസാധ്യതയുള്ള പ്രദേശ മാണിനാൽ മത്സ്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ 10 വർഷം മുൻപേതന്നെ മുൻകരുതലെടുത്ത കർഷക നാണ് ആലപ്പുഴ മാമ്പുഴക്കരി ഫി. ബൈജു മത്സ്യക്കു ഷി ചെയ്യുന്ന മുന്നേക്കർ സ്ഥലത്തിനു പുറം വേലി തീർത്താണ് സുരക്ഷ.

കൃഷിസ്ഥലത്തിനു പുറം ബണ്ട് ഉയർത്തി അതി നൊപ്പം ഇരുന്നൂമ്പലവേലി വേലികെട്ടുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്തത്. അതിനുശേഷം വേലിയിൽ ചെറു വലയം കെട്ടിയുറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനാൽ വെള്ളം ഉയർന്നാലും മത്സ്യങ്ങൾ പുറത്തുപോവില്ല. പരിഗേഷ്യസ് മത്സ്യങ്ങളെയാണ് വളർത്തുന്നത്. 10 വർഷമായ വലയുടെ മേറ്റോടു ചേർന്ന ഭാഗം തുറു വെടുത്തിനാൽ ഇതിലൂടെ അവ അഴിച്ച് തിരിച്ചിട്ടു പരമാവധി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.

ഫോൺ: 8921162319

ത്തിലുള്ള തട്ടുകൾ നിർമ്മിച്ച് അതിൽ മാത്രമേ അലങ്കാരമത്സ്യക്കുഴി നട താറൂ.

കരിമിൻ വിത്തുൽപാദനം

കാലലുകളിൽനിന്നു വെള്ളം കയറ്റി വിറക്കുന്ന ഓരോജലാശങ്ങളിലാണ് കരിമിൻ വിത്തുൽപാദനം നടത്തിവരുന്നതും. വെള്ളപ്പൊക്കം ഈ സംഭവ ണെല്ലാം കാര്യമായി ബാധിക്കുന്നു. ജല നിരപ്പുയരുന്നതിനാലും കളമത്സ്യ ങ്ങൾ കുടി കയറി കുളങ്ങൾ വിത്തുൽ പാദനത്തിനു യോഗ്യല്ലാതാകുന്ന തായാണ് കണ്ടുവന്നത്. കുളങ്ങളുടെ പുറുമുള്ള ബണ്ടുകളുടെ ഉയരം പരമാ വധി ഉയർത്തുക. കുളങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും ചുറ്റുത്തിയത് ഒരു മീറ്റർ ഉയർത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ മുൻ വർഷങ്ങളിൽ വെ ല്ളം കയറിയ അളവ് നീർ മുക്കിയിട്ട് വര ത്തക്കവിടം കല്ലിറമ്പിച്ചു കൂർത്തെ എച്ച്ഡിപിഇ (1 മി.മീ. X 16 മി.മീ.) വലയം ഉപയോഗിച്ചു മൈവ വേലി കെട്ടുക.

പ്രളയാനന്തരം ചെളി പുർത്തമാ യും മാറ്റി വൃത്തിയാക്കി കളസസ്യങ്ങ

ളെയും കളമത്സ്യങ്ങളെയും പരിപൂർണ്ണമായും മാറ്റിയ ശേഷമേ വീണ്ടും വി ത്തുൽപാദനം തുടങ്ങാവൂ. ഇതിനായി ടിസിഡ് പൊടി ഉപയോഗിക്കാം. ഒരു സെന്റ് കുളത്തിൽ 200 ഗ്രാം പൊടിയാ ണ് ആവശ്യം. ഇത് കല്ലുപ്പും ചേർത്ത് 24 മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തു വയ്ക്കുക. കുളത്തിലെ വെള്ളത്തി ന്നു അല്പി പരമാവധി കുറച്ചതിനുശേഷം ഈ മിശ്രിതം തളിക്കുക. ശേഷം കുമ്മായം അല്ലെങ്കിൽ ഡോളോമൈറ്റ് സെന്റിന് 4 കിഗ്രാം എന്ന ക്രമത്തിൽ പ്രയോഗിക്കണം. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ കൃത്യമായ കൃഷിക്ക് ഏകദേശം മത്സ്യ ങ്ങളെ നിരക്ഷരമാക്കാം.

കുട്രമത്സ്യക്കുഴി

കുട്രമത്സ്യക്കുഴി ജലമെ ല മാസത്തി നുള്ളിൽ വിളവെടുക്കാവുന്ന വിധ ത്തിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്യുക. ജലാശ യത്തിൽ കുടുകൾ വച്ചിരിക്കുന്നിടങ്ങ ളിൽ ചെളി അടങ്ങുകയും ആഴം കുറ യാനിടയുള്ളതിനാൽ കുടുകൾ നല്ല ആഴമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രം സ്ഥാ പിക്കുക. വെള്ളം കയറി ഇറങ്ങിയ ശേഷം കുടുകൾക്ക് കഴിയാതിൽ കേടു പാടുകയും ഇല്ലെങ്കിൽ കുടി അവയുടെ വലയം അഴിപ്പെടുത്തി പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രളയസമയത്ത് പലതരം വസ്തുക്കൾ വലകളിൽ അടങ്ങു ചെറിയ കിറലുകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ടാകാം. ഇവയ്ക്കു പുറം ചട്ടയുള്ള കുടുകൾ പുറത്തേക്ക് എടുത്ത്, ഉണക്കി വൃത്തിയാക്കി ആന്റി ഫാളിജിൻ പൊയിന്റ് അടി ചൂടിനു ശേഷം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. വെള്ളം കയറിയ കുളങ്ങളിലെ കു ടുവലയം മാറ്റി പുതിയ വലകളിൽ മീനുകളെ ഇടണം.

വിലാസം: ബിജു കൃഷിവിജ്ഞാന കേന്ദ്രം, ബാറയ്ക്കൽ, എറണാകുളം ഇ മെയിൽ: kvk.ernakulam@icar.gov.in

പ്രളയശേഷം കുമ്പിൾരോഗം



പ്രളയത്തിനു ശേഷം ജലാശങ്ങളിൽ മത്സ്യങ്ങൾക്ക് എപിസോട്ടിക് ആൾഗ്വൈൻസിസ് രോഗം എന്ന കുമ്പിൾരോഗം വരുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ അസുഖം ശ്വാലജലാശങ്ങളിലു മ്ലം ഓരോജലാശങ്ങളിലും വളരുന്ന മത്സ്യങ്ങൾക്കു വാടം ശരീരത്തിൽ വണ്ടങ്ങൾ, ചെറിയ വട്ടത്തിൽ ചുവന്ന പാടുകൾ, മുറിവുകൾ, പഴുപ്പ് എന്നിവയും ചെമ്പുവലയം പൊതിയിരിക്കുന്നതും മാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ. പ്രളയാനന്തരം വെള്ളത്തിന്റെ താപനിലയിലും ആർതമിറ്റുണ്ടാകുന്ന കുറവാണ് രോഗകാരണം. ആദ്യം ക്ഷാമനില(പിഎച്ച്) അനുസരിച്ചു സെന്റി മണിന് 100 ഗ്രാം മുതൽ 500 ഗ്രാം വരെ കുമ്മായം ഉപയോഗിച്ച് പടരുന്നതും ഒരു പരിധിവരെ തടയാം. രോഗമുള്ള മത്സ്യങ്ങളെ പുറത്തു ശേഷം കുളങ്ങളിൽനിന്നു മാറ്റണം. ഇല്ലെങ്കിൽ കുടുകൾ മത്സ്യ ങ്ങളിലേക്ക് രോഗം പടരും.