



# പുത്തൻ തീറ്റപ്പുൽ വിളകൾ



വേലികളിൽ 55 സെ.മീ അകലത്തിലും നടാം. ഹെഡ്ജ് ലൂസേൺ - 50 സെ.മീ അകലത്തിൽ നട്ട് ദിവസവും 300 ദിവസവും തുടർന്ന് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലും ജലസേചനം ഉറപ്പുവരുത്തുക. (മുളയ്ക്കൽ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിന് വീത്ത് 80° C ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ (തിളച്ച വെള്ളം 5 മിനിറ്റ് ആറിയതിനുശേഷം) 4 മിനിറ്റു നേരം വച്ചതിനുശേഷം ഒരുമണിക്കൂർ വെയിലത്തുണക്കി വിതയ്ക്കാം

**വളപ്രയോഗം :** സുബാബുൾ, അഗത്തി - 40 കിലോ ചാണകം അടിവളമായി ഒരു സെന്ററിന് 0.2 കിലോ യൂറിയ 0.6 കിലോ സൂപ്പർ ഫോസ്ഫേറ്റ്, 0.24 കിലോ പൊട്ടാഷ്  
 ഹെഡ്ജ് ലൂസേൺ - സെന്ററിന് 100 കിലോ ചാണകം അടിവളമായി. 0.2 കിലോ യൂറിയ, 0.5 കിലോ സൂപ്പർ ഫോസ്ഫേറ്റ്, 0.2 കിലോ പൊട്ടാഷ്

**വിളവെടുപ്പ് :** സുബാബുൾ, അഗത്തി - 6 മാസം (1.5- 1.75 മീ ഉയരം) കഴിഞ്ഞ് ഇല, ഇളം തണ്ടുകൾ എന്നിവ അരിഞ്ഞെടുക്കാം. (തറനിരപ്പിൽ നിന്നു 70-80 സെ.മീ ഉയരത്തിൽ വെച്ച്). പിന്നീട് 45-50 ദിവസം ഇടവിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാം.  
 ഹെഡ്ജ് ലൂസേൺ - 90 ദിവസം (45-50 സെ.മീ ഉയരം എത്തുമ്പോൾ) പിന്നീട് 35 - 40 ദിവസം ഇടവേളയിൽ

**വിളവ് :** സുബാബുൾ-120-200 കിലോ/സെന്റ് അഗത്തി- 200-400 കിലോ/സെന്റ് ഹെഡ്ജ് ലൂസേൺ - 300-350 കിലോ/സെന്റ്

**പോഷക ഗുണം :** സുബാബുൾ അഗത്തി ഹെഡ്ജ് ലൂസേൺ

അസംസ്കൃത മാംസ്യം -	15-30%	16-25%	20-22%
അസംസ്കൃത നാർ -	8-14%	19-30%	-

പ്രസാദകൻ : ഡോ.എ.ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, ഡയറക്ടർ, സി.എം.എഫ്.ആർ.ഐ, തയ്യാറാക്കിയത് : ഡോ. കെ. സ്മിത ശിവദാസൻ, ഡോ. ഷിനോജ് സുബ്രമണ്യൻ കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം, എറണാകുളം.



**ഐ.സി.എ.ആർ - കൃഷിവിജ്ഞാന കേന്ദ്രം എറണാകുളം**  
**ഐ.സി.എ.ആർ - കേന്ദ്ര സമുദ്ര മത്സ്യ ഗവേഷണ സ്ഥാപനം,**  
 (കാർഷിക ഗവേഷണ വിദ്യാലയം വകുപ്പ്, കൃഷി മന്ത്രാലയം, ഭാരത സർക്കാർ)  
 ആറാട്ടുവഴി ബീച്ച് - ഞാറക്കൽ പി.ഒ., എറണാകുളം, 682505

കന്നുകാലി വളർത്തലിൽ 70 ശതമാനത്തിലധികം ചിലവ് തീറ്റയ്ക്കുവേണ്ടി മാത്രം വരുമെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. പച്ചപ്പുല്ലിന് ധാരാളം നൽകാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ തീറ്റയുടെ ചിലവ് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. തീറ്റപ്പുല്ലും പയർവർഗ്ഗതീറ്റവിളകളും 3:1 അനുപാതത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ തീറ്റയുടെ പോഷകഗുണം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും പാലിൽ കൊഴുപ്പിന്റെ അളവ് കൂട്ടാനും സഹായിക്കുന്നതാണ്. വിവിധയിനം പയർവർഗ്ഗ - വൃക്ഷ തീറ്റ വിളകൾ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും കേരളത്തിൽ ഇവ അത്ര പ്രചാരത്തിലില്ല. ഇത്തരം കാലിതീറ്റ വിളകളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അവബോധം ഉണ്ടാക്കുക എന്നതാണ് ഈ കൃഷി വിജ്ഞാന പരമ്പരയുടെ ഉദ്ദേശം.

### തീറ്റപ്പുൽ ധാന്യവിളകൾ

മക്കച്ചോളം

- നടീൽ സമയം** : ജൂൺ, ജൂലൈ, സെപ്റ്റംബർ - ഒക്ടോബർ
- നടീൽ രീതി** : 30 സെ.മീ അകലത്തിൽ വാരം എടുത്ത് 15 സെ.മീ അകലത്തിൽ 2 വിത്ത് വീതം 5 സെ.മീ ആഴത്തിൽ നടുക.
- വിത്തിന്റെ അളവ്** : 160 - 180 ഗ്രാം/സെന്റ്
- വളപ്രയോഗം** : 40 കിലോ ചാണകവും അടിവളമായി ഒരു സെന്റിന്, 1 കിലോ യൂറിയ 0.4 കിലോ സൂപ്പർ ഫോസ്ഫേറ്റ് 0.24 കിലോ പൊട്ടാഷ്
- വിളവെടുപ്പ്** : 70-75 ദിവസത്തിന് ശേഷം ചോളമണികൾ പാൽപരുവമാവുമ്പോൾ ചെടി മുഴുവൻ വെട്ടി അരിഞ്ഞ് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്
- വിളവ്** : 180 - 240 കിലോ / സെന്റ്
- പോഷക ഗുണം** : അസംസ്കൃത മാംസ്യം - 7-10% , അസംസ്കൃത നാർ - 25-30%

### തീറ്റപ്പുൽ പയറുവിളകൾ

സ്റ്റേലോസാന്തസ്, വൻപയർ

- നടീൽ സമയം** : മെയ് - ജൂൺ (ജലസേചന സൗകര്യമനുസരിച്ച്)
- വിത്തിന്റെ അളവ്** : സ്റ്റേലോസാന്തസ് - തനി വിളയായി 40 ഗ്രാം/ സെന്റ്  
വൻപയർ - 160-200 ഗ്രാം/ സെന്റ്
- നടീൽ രീതി** : സ്റ്റേലോസാന്തസ്-ചെറിയ വിത്തായതിനാൽ നിലം നന്നായി ഒരുക്കുക. വിത്ത് തലേരാത്രി കുതിർത്തതിനു ശേഷം മണൽ ചേർത്ത് വിതയ്ക്കുക. വൻപയർ - 3 മീറ്റർ വിട്ട് ചാലുകൾ ഉണ്ടാക്കി വരികൾക്കിടയിൽ 15-20 സെ.മീ അകലത്തിൽ വിത്ത് നടുക.
- വളപ്രയോഗം** : സെന്റോന്നിന് 40 കിലോ ചാണകവും അടിവളമായി 0.2 കിലോ യൂറിയ 1 കിലോ സൂപ്പർ ഫോസ്ഫേറ്റ് 0.24 കിലോ പൊട്ടാഷ്
- വിളവെടുപ്പ്** : സ്റ്റേലോസാന്തസ് - 80- 90 ദിവസത്തിനുള്ളിലു പിന്നീട് 45 ദിവസം ഇടവേളകളിൽ 12 മാസം വരെ. വൻപയർ-ആദ്യ വിളവ് 45 ദിവസത്തിന് ശേഷം തുടർന്ന് 30 ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ചെടി മുഴുവൻ വെട്ടി അരിഞ്ഞ് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്.
- വിളവ്** : 140 - 160 കിലോ/സെന്റ്
- പോഷക ഗുണം** : സ്റ്റേലോസാന്തസ് വൻപയർ  
അസംസ്കൃത മാംസ്യം - 12 - 18% 16%  
അസംസ്കൃത നാർ - 35% 20%

### തീറ്റപ്പുൽ വൃക്ഷ വിളകൾ

സുബാബൂൾ (പീലിവാക), അഗത്തി, ഹെഡ്ജ് ലൂസേൺ

- നടീൽ സമയം** : മെയ് -ജൂൺ തുടർന്ന് മഴ ലഭിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ നടാം
- വിത്തിന്റെ അളവ്** : സുബാബൂൾ - 16 ഗ്രാം/സെന്റ്  
അഗത്തി - 30 ഗ്രാം/സെന്റ്  
ഹെഡ്ജ് ലൂസേൺ -80 ഗ്രാം/സെന്റ്
- നടീൽ രീതി** : സുബാബൂൾ, അഗത്തി - തനിവിളയായി 1 മീറ്റർ അകലത്തിലും