## The first occurrence of Pompano dolphinfish, Corvphaena equiselis (Linnaeus, 1758) at Chennai coast in Bay of Bengal

On 5.9.09, the first occurrence of Pompano

कोरिफीना इक्विसेलिस (लिनेयस, 1758) की प्रथम उपस्थिति

चेन्नई मात्स्यिकी पोताश्रय में यंत्रीकृत गिल जाल द्वारा 5-9-2009 को

dolphinfish, Coryphaena equiselis was noticed at Chennai

पोम्पानो डोलिफनिफश, कोरिफीना इक्विसेलिस का पहला अवतरण हुआ।

14

## कडलमीन

सी एम एफ आर आइ समाचार सं. 122, जुलाई - सितंबर 2009

fisheries harbour by mechanized gillnet. The mechanized gillnet was operated from a depth of 30-50 meters at a distance of 30-40 km north Chennai towards Andhra. Normally, dolphinfish, Coryphaena hippurus was landed regularly in east coast of Chennai.



Coryphaena equiselis

उत्तर चेन्नई में आंध्रा की दिशा में लगभग 30-50 कि.मी.की दूरी में लगभग 30-40 मीटर की गहराई में यंत्रीकृत गिल जालों का परिचालन किया गया। साधारणतया चेन्नई के पूर्व तट से नियमित रूप से डोलिफनिफश कोरिफीना हिप्यूरस मिलता रहता था।

काशिमेड और कडलूर मत्स्यन पोताश्रयों से वेल्क का