Occurrence of the reef lobster *Enoplometopus* केरल तट से रीफ महाचिंगट एनोप्लोमेटोपस occidentalis (Randall, 1840) from the Kerala ओक्सिडेन्टालिस (रान्डल, 1840) की उपस्थिति coast

Ten specimens of the reef lobster *Enoplometopus* एनोप्लोमेटोपस ओक्सिडेन्टालिस जिसकी प्रथम उपस्थिति हवाय से दिखायी occidentalis also known as the 'Hawaiian reef lobster' as it

(3) 11 13/11 111/13/14 21/11 17

केरल के कालमक्क मत्स्यन पोताश्रय में 17.9.2009 को रीफ महाचिंगट

कडलमीन

सी एम एफ आर आइ समाचार सं. 122, जुलाई - सितंबर 2009

was first recorded from Hawaii. was observed in the deep sea trawl landing at Kalamukku Fishing Harbour on 17/9/2009. The specimens were caught during the deep sea trawl operations off Ponnani from a depth of 324 m. The species earlier considered a Nephropid lobster under Nephropidae family is now assigned to the family Enoplometopidae. This is the first report of the occurrence of the species along the Indian coast.



Enoplometopus occidentalis

पडने के कारण हवायियन रीफ लोब्स्टर भी कहा जाता है, के दस नमुने पाए गए। पोन्नानी में 324 मी. की गहराई में किए गए गहरा सागर आनाय परिचालन से इन नमनों को पकडा गया। पहले इस जाति को नेफ्रोपिडे कुटुम्ब के अंदर आनेवले नेफ्रोपिड महाचिंगट माना जाता था लोकन अब इन्हें एनोप्लोमेटोपिडे कुटुम्ब के अदंर जोडा गया। भारतीय तट पर इस जाति की पहली उपस्थिति

> (क्रस्टेशियन और वेलापवर्ती मात्स्यिकी प्रभाग)

(Crustacean & Pelagic Fisheries Division)